

Przygotowanie pacjenta do badania : ENDOSKOPIA KAPSUŁKOWA

Pacjent nie powinien jeść przez 24 godziny przed ustaloną datą i godziną badania. W tym okresie może jednak pić dowolną ilość klarownych, niegazowanych płynów. Picie płynów należy przerwać na 4 godziny przed ustaloną godziną badania.

Jeśli pacjent cierpi na zaparcia, lub wypróżnia się nieregularnie lub rzadziej niż codziennie, prosimy dzień przed badaniem rano przyjąć lek przeczyszczający- 2 torebki preparatu Fortrans rozpuszczone w 2 litrach wody.

Przed rozpoczęciem badania założony zostanie na pasku rekorder, który będzie zbierał sygnały z kamery mieszczącej się w kapsułce i zapisywał w postaci filmu.

Po założeniu rekordera, pacjent połyka kapsułkę, która ma wielkość dużej tabletki i popija wodą. Kapsułka jest całkowicie szczelna i jednorazowa. Przemieszcza się ona przez przełyk, żołądek i jelito cienkie wysyłając do rekordera obraz wnętrza tych narządów.

Po 3 godzinach od połknięcia kapsułki pacjent może rozpocząć picie płynów, a po kolejnych 2 godzinach zjeść niewielki posiłek.

Po 8 godzinach od rozpoczęcia badania prosimy o ponowną wizytę w naszej klinice. Zdejmujemy wtedy rekorder z zapisem filmowym. Kapsulka zostaje zwykle wydalona podczas wypróżnienia w następnych dniach.

Wynik badania będzie dostępny po kilku dniach- lekarz oceniający musi obejrzeć 8 godzinny film zapisany w rekorderze.